

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -


☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 64
du 23 Août 1985

V I G N E



- Tordeuses de la grappe :

Cette troisième génération, est très étalée et le vol de cochyliis est décalé de 8 jours par rapport au vol d'eudémis - un seul traitement curatif pourra donc être envisagé dans les secteurs d'ALERIA ET GHISONACCIA jusqu'à PORTO-VECCHIO, où les chenilles, sont déjà visibles, en particulier sur les grappes à grains serrés ou dans les situations où les risques de pourriture grise sont importants :

Sur CALVI, CAP, PATRIMONIO, MARANA CASINCA et Nord de la plaine Orientale où les vols enregistrés sont plus faibles, ne traiter que dans les zones sensibles à la pourriture grise, où si vous avez dénombré une chenille pour dix grappes, le traitement et à réaliser du 26 au 28 Août. Préférez les produits à action de choc " Type Parathion "

Mildiou : le dernier traitement au cuivre est encore possible

Oïdum : N'est plus à craindre

Esca : Les cas de dépérissements sont observés en toutes zones repérez les parcelles atteintes pour y envisager un traitement d'hiver.

A G R U M S

Le traitement insecticide généralisé est à faire dans la semaine du 26 au 30 Août. N'hésitez pas à changer de matière active. De nombreux produits sont utilisables. Préférez L'ULTRACIDE en présence de cochenilles Utiliser un volume suffisant 2000 litres par hectare et ajouter 1 % d'huile blanche d'été pour renforcer l'efficacité.

- ARBRES FRUITIERS



- Tordeuse Orientale

Un traitement est encore possible sur les variétés tardives -
Respectez les délais avant récolte.

- Maladies de conservation de pêches

La contamination se produit pendant la maturation des fruits -
la manutention et la récolte de fruits doivent se réaliser avec le moins
de manipulation possible. La lutte contre le RHIZOPUS en particulier
s'avère difficile :

- Utiliser :	Benomyl	BENLATE
	Captafol	DIFOSAN, ORTHODIFOLATAN
	Folpel	N 5
	Iprodione	KIDAN, ROVRAL
	Vinchlozoline	RONILAN
	Procymidone	SUMISCLEX
	Triforine	SAPROL DENARIN

Deux traitements sont recommandés à trois semaines, puis Sept jours
avant récolte.

- OLIVIER S

Mouches de l'Olive



Dans les zones d'altitude inférieure à 200 Mètres on observe parfois
5 à 10 % d'olives piquées (Sur AJACCIO SARTENE, PORTO-VECCHIO)
S'il n'a pas déjà été réalisé le traitement par insecticide et attractif
est à faire d'urgence.

P I N S

Processionnaire du pin

Les premières captures de papillons sont enregistrées. Des pontes ont
été observés cette semaine. Ne pas intervenir pour l'instant.

---000---

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1985 -Toute
Reproduction partielle est soumise à notre autorisation.